

# ACTES INVASIFS EN SOINS DE VILLE

**Actes invasifs concernés :** les actes qui nécessitent une effraction cutanée plus importante qu'une simple ponction veineuse, tels que actes avec incision cutanée, infiltration articulaire ou périarticulaire, insertion d'implants contraceptifs, incision / drainage d'abcès, ponction articulaire, ablation de kyste, biopsie cutanée...

**Actes invasifs exclus :** les sondages urinaires, la pratique d'endoscopie, l'utilisation des sondes endocavitaires, la mise en place de stérilet, la réalisation d'injection intramusculaire, sous-cutanée, intradermique ou de ponction veineuse.

## Information et surveillance

- Pour un geste programmé, recommander une douche ou à minima un savonnage et un rinçage de la zone concernée
- Préciser la durée de maintien du pansement, les précautions à prendre : si pansement mouillé/souillé le changer rapidement, éviter les baignades dans les suites du geste, manipuler le pansement avec des mains propres lavées au savon ou frictionnées avec un PHA
- Si apparition de frissons et/ou de fièvre, d'un écoulement, d'une rougeur ou apparition d'un gonflement, d'une douleur intense au niveau du point de ponction/incision contacter sans tarder le professionnel

## Dispositifs médicaux réutilisables

- Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux réutilisables (DMR) adaptée au niveau de risque (faible risque, risque intermédiaire, haut risque)

Pour désinfecter mes DMR



## Le geste

- Désinfecter les mains avec un PHA
- Gants stériles si contact avec le site de ponction ou si incision, après antiseptie
- Changer l'aiguille en cas d'échec avant la nouvelle tentative
- Élimination dans un container sécurisé

## Préparation cutanée

- Si peau souillée : détertion au savon, rinçage puis séchage avec des compresses non stériles
- Antiseptie avec des compresses stériles :
  - peau non lésée avec un antiseptique alcoolique
  - peau lésée avec un antiseptique non alcoolique (Polyvidone iodée dermique, Dakin),
  - séchage spontané = temps d'action de l'antiseptique

## Information et surveillance

Les incontournables pour prévenir les Infections Associées aux Soins (IAS)

## Dispositifs médicaux réutilisables



## Le geste



## Préparation cutanée



## Préparation matériel et produits

- Désinfecter les mains avec un PHA
- Si nécessaire déposer le matériel sur un champ stérile
- Pour les produits à reconstituer ou à prélever :
  - Désinfecter le bouchon après retrait de l'opercule avec une compresse imbibée d'alcool à 70° ou un antiseptique alcoolique (contact 30 secondes)
  - Si retrait du bouchon, utiliser une compresse imbibée d'alcool à 70° ou d'un antiseptique alcoolique
  - Flacon à patient unique, ex : xylocaïne, produit de contraste...
  - Éliminer l'aiguille de prélèvement dans un container sécurisé

## Hygiène des mains



- Seulement avec un produit hydroalcoolique (PHA) sur des mains visuellement propres
- Avec des ongles courts sans bijoux ni vernis ni faux ongles ou résine, avant-bras dégagés
- Avec une quantité de PHA suffisante (environ 3 ml ou le creux de la main) pour frictionner les mains pendant au moins 30 secondes et jusqu'au séchage complet

Pour choisir mon PHA et faire une friction avec la bonne technique



## Tenue patient et opérateur

Patient

- Masque si risque de postillonner sur le site

Opérateur

- Masque si symptôme ORL ou si l'opérateur parle pendant le geste
- Tenue propre, cheveux attachés

## Tenue patient et opérateur

## Environnement

- Fermer portes et fenêtres (pas de courants d'air)
- Plan de travail :
  - éloigné d'un point d'eau, désencombré, non poreux, non détérioré
  - Entretien avec un détergent désinfectant (lingette prête à l'emploi à usage unique ou lavette réutilisable propre) et laisser sécher

Pour bien choisir mes produits détergents désinfectants



## Préparation matériel et produits